

# Chapitre 8

## Suites usuelles

### 8.1 Suites arithmétiques

#### 8.1.1 Définition

**Définition 8.1.** Soient  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite numérique réelle. On dit que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est **arithmétique** s'il existe un nombre réel  $r$  tel que pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$u_{n+1} = u_n + r.$$

Le réel  $r$  est appelé *raison* de la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

**Exemples :** Les suites définies par  $u_0 = 2$ , respectivement  $v_2 = 3$ , et  $u_{n+1} = u_n + 3$ , respectivement  $v_{n+1} = v_n - 4$ , sont des suites arithmétiques de raison 3 et  $-4$ .

★ Vidéo.

#### 8.1.2 Terme général

**Théorème 8.1.** Soient  $r$  un nombre réel et  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite arithmétique de raison  $r$ . Quels que soient les entiers naturels  $n$  et  $p$ , on a :

$$u_n = u_0 + n \times r, \quad u_n = u_1 + (n - 1) \times r, \quad u_n = u_p + (n - p) \times r.$$

*Démonstration.* Soient  $r \in \mathbb{R}$  et  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  suite arithmétique de raison  $r$ . Pour tout  $k \in \mathbb{N}$ , on a :

$$u_{k+1} = u_k + r.$$

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$  :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n-1} u_{k+1} &= \sum_{k=0}^{n-1} (u_k + r) \\ \sum_{k=1}^n u_k &= \sum_{k=0}^{n-1} u_k + \sum_{k=0}^{n-1} r \\ \sum_{k=1}^{n-1} u_k + u_n &= u_0 + \sum_{k=1}^{n-1} u_k + n \times r \\ u_n &= u_0 + n \times r. \end{aligned}$$

On a donc obtenu la première égalité. La seconde est un cas particulier de la troisième qui s'obtient en adaptant les égalités ci-dessus.  $\square$

**Exemples :** En reprenant l'exemple précédent, on trouve que  $u_n = 2 + 3n$  et  $v_n = 3 - 4(n - 2)$ .

**Exemple :** Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite arithmétique dont on sait que  $u_3 = 24$  et  $u_8 = 74$ . On sait que, si  $p < n$ ,

$$u_n = r \times (n - p) + u_p.$$

Avec  $p = 3$  et  $n = 8$ , on a alors  $u_8 = r \times (8 - 3) + u_3$ , ou encore  $74 = 5r + 24$ . On en déduit que la raison de notre suite est  $r = 10$ ; reste à déterminer son terme initial  $u_0$ . On sait que  $u_3 = 3r + u_0$ , donc que  $u_0 = u_3 - 3r = 24 - 30 = -5$ .


Notre suite a donc pour terme général  $u_n = -5 + 10n$ .

★ Vidéo 1 ; vidéo 2.

**Corollaire** Soient  $r \in \mathbb{R}$  et  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite arithmétique de raison  $r$ . Les points de la représentation graphique de  $u$  sont alignés.

*Démonstration.* Soit  $u$  suite arithmétique de terme initial  $u_0$  et de raison  $r$ . En vertu du théorème précédent, on peut écrire :  $u_n = f(n)$  où  $f$  est une fonction affine définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = rx + u_0$ .  $\square$

**Remarque :** une suite arithmétique est donc une discrétisation d'une fonction affine.



### 8.1.3 Variations d'une suite arithmétique

**Propriété 8.1.** Soient  $r$  un nombre réel et  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite arithmétique de raison  $r$ .

- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est strictement croissante si et seulement si  $r > 0$ .
- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est strictement décroissante si et seulement si  $r < 0$ .
- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est constante si et seulement si  $r = 0$ .

*Démonstration.* Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on a :  $u_{n+1} - u_n = r$ . On considère alors le signe de  $r$ .  $\square$

**Exemples :**

1. La suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de raison  $r = 5$  et avec  $u_0 = 0$  est croissante : on a

$$0, 5, 10, 15, 20, 25 \dots$$

2. La suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de raison  $r = 0$  et avec  $u_0 = 2$  est constante égale à 2 : on a

$$2, 2, 2, 2, 2, 2 \dots$$

3. La suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de raison  $r = -3$  et avec  $u_0 = 2$  est décroissante : on a

$$2, -1, -4, -7, -10, -13 \dots$$

★ Vidéo.

### 8.1.4 Somme des termes d'une suite arithmétique

**Théorème 8.2.** Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite arithmétique. Quels que soient les entiers naturels  $n$  et  $p$  tels que  $p \leq n$  :

$$\sum_{k=0}^n u_k = (n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}, \quad \sum_{k=p}^n u_k = (n-p+1) \times \frac{u_p + u_n}{2}.$$

**Remarque** On peut retenir la formulation :

$$\text{Somme} = \text{nombre de termes} \times \frac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}.$$

*Démonstration.* On note  $S$  la première somme recherchée. On a alors :

$$S = \sum_{k=0}^n u_k \quad \text{et} \quad S = \sum_{k=0}^n u_{n-k}.$$

En sommant ces deux égalités, on obtient :

$$\begin{aligned} 2S &= \sum_{k=0}^n (u_k + u_{n-k}) \\ 2S &= \sum_{k=0}^n (u_0 + kr + u_0 + (n-k)r) \\ 2S &= \sum_{k=0}^n (u_0 + u_0 + nr) \\ 2S &= \sum_{k=0}^n (u_0 + u_n) \\ 2S &= (n+1)(u_0 + u_n) \\ S &= (n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}. \end{aligned}$$

□

**Exemples :**

- On considère la suite arithmétique  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de raison  $r = -4$  et de premier terme  $u_0 = 4$ . On a donc  $u_{100} = 4 - 4 \times 100 = -396$ . La somme des cent premiers termes de cette suite est :

$$\sum_{k=0}^{100} u_k = 101 \times \frac{4 - 396}{2} = -19796.$$

2. On considère la suite arithmétique  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de raison  $r = 4$  et de premier terme  $u_5 = 3$ . On a donc  $u_{30} = 3 + 4 \times (30 - 5) = 103$ . La somme des trente premiers termes de cette suite est :

$$\sum_{k=5}^{30} u_k = 26 \times \frac{3 + 103}{2} = 1378.$$

★ Vidéo 1; vidéo 2.

## 8.2 Suites géométriques

### 8.2.1 Définition

**Définition 8.2.** Soient  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite numérique réelle. On dit que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est **géométrique** s'il existe un nombre réel  $q$  tel que pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$u_{n+1} = u_n \times q.$$

Le réel  $q$  est appelé **raison** de la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

**Exemples :** Les suites définies par  $u_0 = 2$ , respectivement  $v_2 = 3$ , et  $u_{n+1} = 3u_n$ , respectivement  $v_{n+1} = -4v_n$ , sont des suites arithmétiques de raison 3 et  $-4$ .

★ Vidéo.

### 8.2.2 Terme général

**Théorème 8.3.** Soient  $q$  un nombre réel  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite géométrique de raison  $q$ . Quels que soient les entiers naturels  $n$  et  $p$ , on a :

$$u_n = u_0 \times q^n, \quad u_n = u_1 \times q^{n-1}, \quad u_n = u_p \times q^{n-p}.$$

*Démonstration.* Soient  $q \in \mathbb{R}^*$  et  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  suite géométrique de raison  $q$ . Pour tout  $k \in \mathbb{N}$ , on a :

$$u_{k+1} = u_k \times q$$

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$  :

$$\begin{aligned} \prod_{k=0}^{n-1} u_{k+1} &= \prod_{k=0}^{n-1} (u_k \times q) \\ \prod_{k=1}^n u_k &= \prod_{k=0}^{n-1} u_k \times \prod_{k=0}^{n-1} q \\ \prod_{k=1}^{n-1} u_k \times u_n &= u_0 \times \prod_{k=1}^{n-1} u_k \times q^n \\ u_n &= u_0 \times q^n. \end{aligned}$$

On a donc obtenu la première égalité. La seconde est un cas particulier de la troisième qui s'obtient en adaptant les égalités ci-dessus.  $\square$

**Exemples :** En reprenant l'exemple précédent, on trouve que  $u_n = 2 \times 3^n$  et  $v_n = 3 \times (-4)^{n-2}$ .

**Exemple :** Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite géométrique dont on sait que  $u_3 = 24$  et  $u_8 = 768$ . On sait que, si  $p < n$ ,

$$u_n = q^{n-p}u_p.$$

Avec  $p = 3$  et  $n = 8$ , on a alors  $u_8 = q^{8-3}u_3$ , ou encore  $768 = q^5 \times 24$ . On en déduit que  $q^5 = \frac{768}{24} = 32$ , donc que  $q = 32^{\frac{1}{5}} = 2$ . On a donc déterminé la raison de notre suite :  $q = 2$ ; reste à déterminer son terme initial  $u_0$ . On sait que  $u_3 = q^3u_0$ , donc que  $u_0 = \frac{u_3}{q^3} = \frac{24}{2^3} = \frac{24}{8} = 3$ .

Notre suite a donc pour terme général  $u_n = 3 \times 2^n$ .

★ Vidéo 1; vidéo 2.

### 8.2.3 Variation d'une suite géométrique

**Propriété 8.2.** Soient  $q$  un nombre réel et  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite géométrique de raison  $q$ . On suppose que  $u_0 > 0$ .

- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est strictement croissante si et seulement si  $q > 1$  ;
- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est strictement décroissante si et seulement si  $0 < q < 1$  ;
- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est constante si et seulement si  $q = 1$  ;
- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  n'est pas monotone si  $q < 0$ .

**Exemples :**

1. La suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de raison  $q = 5$  et avec  $u_0 = 2$  est croissante : on a

$$2, 10, 50, 250, 1250, 6250\dots$$

2. La suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de raison  $q = 1$  et avec  $u_0 = 2$  est constante égale à 2 : on a

$$2, 2, 2, 2, 2, 2\dots$$

3. La suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de raison  $q = \frac{1}{5}$  et avec  $u_0 = 2$  est décroissante : on a

$$2, \frac{2}{5}, \frac{2}{25}, \frac{2}{125}, \frac{2}{625}, \frac{2}{3125}\dots$$

4. La suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de raison  $q = -5$  et avec  $u_0 = 2$  est alterné :

$$2, -10, 50, -250, 1250, -6250\dots$$

★ Vidéo.

### 8.2.4 Somme des termes d'une suite géométrique

**Théorème 8.4.** Soient  $q \in \mathbb{R}$  distinct de 1 et  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite géométrique de raison  $q$ . Quels que soient les entiers naturels  $n$  et  $p$  tels que  $p \leq n$  :

$$\sum_{k=0}^n u_k = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}, \quad \sum_{k=p}^n u_k = u_p \times \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q}.$$

**Remarque** On peut retenir la formulation :

$$\text{Somme} = \text{premier terme} \times \frac{1 - \text{raison}^{\text{nombre de termes}}}{1 - \text{raison}}.$$

*Démonstration.* On note  $S$  la première somme recherchée :

$$S = \sum_{k=0}^n u_k. \quad (8.1)$$

En multipliant (8.1) par  $q$ , on obtient :

$$qS = \sum_{k=0}^n q \times u_k = \sum_{k=0}^n u_{k+1} = \sum_{k=1}^{n+1} u_k. \quad (8.2)$$

On soustrait alors (8.2) à (8.1) :

$$\begin{aligned} S - qS &= u_0 - u_{n+1} \\ (1 - q)S &= u_0 - u_0 \times q^{n+1} \\ S &= u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}. \end{aligned}$$

□

#### Exemples :

1. On considère la suite géométrique  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de raison  $q = 0.5$  et de premier terme  $u_0 = 4$ . La somme des cent premiers termes de cette suite est :

$$\sum_{k=0}^{100} u_k = 4 \frac{1 - 0.5^{101}}{1 - 0.5} = 4 \frac{1 - 0.5^{101}}{0.5} = 8(1 - 0.5^{101}) \simeq 8.$$

2. On considère la suite géométrique  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de raison  $q = 4$  et de premier terme  $u_5 = 3$ . La somme des trente premiers termes de cette suite est :

$$\sum_{k=5}^{30} u_k = 3 \frac{1 - 4^{30-5+1}}{1 - 4} = 3 \frac{1 - 4^{26}}{-3} = 3^{26} - 1 = 2541865828328.$$

★ Vidéo.

## 8.3 Attendus et savoir-faire

- Déterminer si une suite est arithmétique / géométrique ou non.
- Passer de la relation de récurrence d'une suite arithmétique / géométrique à son terme général et inversement.
- Déterminer les variations d'une suite arithmétique / géométrique.
- Calculer la somme des termes d'une suite arithmétique / géométrique.
- Modéliser un problème par une suite arithmétique / géométrique.

## 8.4 Exercices

### 8.4.1 Démarrage

**Exercice 8.1.** Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite arithmétique de premier terme  $u_0$  et de raison  $r$ . Dans chaque cas, calculer  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$ .

1.  $u_0 = 1$  et  $r = 3$ .
2.  $u_0 = 5$  et  $r = -2$ .
3.  $u_0 = -2$  et  $r = -\frac{1}{4}$ .

**Exercice 8.2.** Donner le terme général des suites de l'exercice 8.1.

**Exercice 8.3.** Donner les variations des suites de l'exercice 8.1.

**Exercice 8.4.** Donner la somme des 100 premiers termes des suites de l'exercice 8.1.

**Exercice 8.5.** Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite géométrique de premier terme  $u_0$  et de raison  $r$ . Dans chaque cas, calculer  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$ .

1.  $u_0 = 1$  et  $q = 3$ .
2.  $u_0 = 5$  et  $q = -2$ .
3.  $u_0 = -2$  et  $q = -\frac{1}{4}$ .

**Exercice 8.6.** Donner le terme général des suites de l'exercice 8.5.

**Exercice 8.7.** Donner les variations des suites de l'exercice 8.5.

**Exercice 8.8.** Donner la somme des 100 premiers termes des suites de l'exercice 8.5.

### 8.4.2 Approfondissement

**Exercice 8.9.** Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite arithmétique. Dans chaque cas, donner le terme général de  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

1.  $u_0 = 1$  et  $u_3 = 5$ .
2.  $u_1 = -5$  et  $u_9 = -7$ .
3.  $u_{10} = 0$  et  $u_{15} = \frac{2}{3}$ .

**Exercice 8.10.** Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2$ . On considère la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = f(n+1) - f(n)$ .

1. Calculer  $u_0$ .
2. Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .
3. En déduire que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est arithmétique et préciser sa raison.

**Exercice 8.11. [Sylviculture]** Un arbre mesurant 1m lors de sa plantation voit sa hauteur augmenter chaque année de la même longueur. On note  $u_0$  sa hauteur initiale et  $u_n$  sa hauteur  $n$  année après sa plantation.

1. Sachant que l'arbre a doublé de hauteur en deux ans, de combien a-t-il poussé chaque année ?
2. Par quelle nombre sera multiplié sa hauteur initiale au bout de quatre ans ?
3. Quelle est la nature de  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  ? Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .
4. Au bout de combien d'année la hauteur dépassera 25m ?

**Exercice 8.12. [Écureuil]** Un écureuil décide de faire des réserves de noisettes pour l'hiver. Le premier jour, il compte le nombre de noisettes qu'il lui reste en réserve : il en a 40. À partir du second jour, il ajoute 10 noisettes supplémentaires à son stock chaque jour. On note  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite donnant le nombre de noisettes en réserve au  $n$ -ème jour de récolte, ainsi  $u_0 = 40$ .

1. Calculer  $u_1$  et  $u_2$ .
2. Quelle est la nature de  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ . Préciser sa raison.
3. Donner l'expression de  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  en fonction de  $n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
4. L'écureuil estime qu'il a besoin de 500 noisettes en réserve pour passer l'hiver. Au bout de combien de jours aura-t-il atteint ce nombre ?

**Exercice 8.13.** Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite géométrique. Dans chaque cas, donner le terme général de  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

1.  $u_0 = 1$  et  $u_3 = 5$ .
2.  $u_1 = -5$  et  $u_9 = -7$ .
3.  $u_{10} = 1$  et  $u_{15} = \frac{2}{3}$ .

**Exercice 8.14. [Origami, algorithmique]** Une feuille de papier a une épaisseur de 0,15mm ; on note  $e_0$  cette épaisseur. Chaque fois qu'on l'on plie la feuille en deux, son épaisseur double ; on note  $e_n$  son épaisseur après  $n$  pliages.

1. Calculer  $e_1$  et  $e_2$ .
2. Quelle est la nature de la suite  $(e_n)$  ? Donner son terme général.
3. Écrire un algorithme donnant le nombre de pliage nécessaire pour que l'épaisseur de la feuille soit aussi grande que la distance Terre Soleil.
4. Réaliser cet algorithme en Python ou à l'aide d'un tableur.

**Exercice 8.15. [L'échiquier de Sissa]** La légende raconte qu'un antique roi des Indes – afin de tromper l'ennui – demanda à ce qu'on lui crée un jeu ; c'est ainsi qu'un sage nommé Sissa inventa alors un jeu d'échecs. Pour le remercier, le roi lui offrit le choix de sa récompense ; Sissa lui répondit alors « Sire, placez un grain de riz sur la première case de l'échiquier, deux sur la deuxième, quatre sur la troisième et ainsi de suite en doublant à chaque fois le nombre de grain de riz... Je prendrai tout le riz sur le plateau ! ». Le roi, trouvant cette demande bien modeste, l'accepta.

On note  $u_n$  le nombre de grain de riz sur la  $n$ -ème case du plateau.



1. Donner les valeurs de  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$ .
2. Quelle est la nature de la suite  $(u_n)$ ? Donner son terme général.
3. Déterminer le nombre de grain de riz présent sur les 64 cases du plateau.
4. Sachant que qu'un grain de riz pèse environ  $5 \cdot 10^{-2}$ g et que la production mondiale de riz en 2018 a atteint 779Mt, que pensez-vous de la demande de Sissa?

**Exercice 8.16. [Économie et écologie,\*]** La croissance économique désigne en général la croissance d'un indicateur économique : le PIB (Produit Intérieur Brut). Il s'agit de la somme des biens et services produits par un pays en une année. Bien évidemment la créations de bien et services nécessitent énergie et ressources, ce qui engendre déchets et pollutions. La croissance du PIB s'accompagne donc d'une croissance de la consommation d'énergie et des ressources ainsi que de la pollution. À des fins de simplification, nous ne considérerons que la pollution émise sous forme de gaz à effet de serre en équivalent  $\text{CO}_2$  (il est difficile de quantifier les nombreuses formes de pollutions sous une seule variable). Pour plus d'explication si le sujet vous intéresse vous pouvez aller voir une série de deux vidéos traitant du sujet :

- Croissance et PIB pour les nuls.                      — Croissance et PIB, les limites.

Elles sont faites conjointement par deux vidéastes : Heu'reka et Le Réveilleur. Le premier a une chaîne traitant d'économie et de finance; le second traite de problématiques environnementales telles que la pollution, la gestion des ressources naturelles... Vous pouvez aussi lire cet article de Jean-Marc Jancovici, ingénieur, traitant lui aussi du sujet.

### 1. Le PIB

Notre année de référence ou année zéro sera 1950, le PIB y était d'environ 5 000 milliards de dollars. En 2017, il est estimé à environ 80 000 milliards de dollars. On note  $p_n$  le PIB à l'année  $n$ ; on a donc  $p_0 = 5000$  et  $p_{67} = 80000$  (on garde comme unité le milliard de dollars par commodité). Afin de simplifier, on va supposer que chaque année, le PIB a augmenté d'un pourcentage fixe  $t$  entre 1950 et 2017.

- (a) Expliquer pourquoi on a pour tout entier naturel  $n < 67$ ,  $p_{n+1} = \left(1 + \frac{t}{100}\right) \times p_n$ .
- (b) Quelle est la nature de la suite  $(p_n)$ ? Préciser sa raison et son terme initial puis donner son terme général.
- (c) Calculer le PIB en 2050 s'il continue d'évoluer de la même façon.
- (d) Calculer la somme des richesses produites entre 1950 et 2017.

### 2. La pollution

On sait que la quantité de gaz à effet de serre émise en 2015 est d'environ 20 000 Mt (méga tonne) équivalent  $\text{CO}_2$ . On note  $g_n$  la quantité de  $\text{CO}_2$  émise à l'année  $n$ ; on a donc  $g_{67} = 20000$ . Supposons que la croissance de la quantité de gaz à effet de serre soit deux fois plus petite que celle du PIB.

- (a) Expliquer pourquoi on a pour tout entier naturel  $n < 67$ ,  $g_{n+1} = \left(1 + \frac{t}{200}\right) \times g_n$ .
- (b) Quelle la nature de cette  $(g_n)$ ? Préciser sa raison et son terme initial puis donner son terme général.
- (c) Calculer la quantité de gaz à effet de serre émise en 1950 d'après ce modèle.

- (d) Calculer la quantité de gaz à effet de serre émise en 2050 s'il continue d'évoluer de la même façon.
- (e) Calculer quantité de gaz à effet de serre émise entre 1950 et 2017.

**Exercice 8.17.**  $[0, 999\dots, **]$  Dans un nombre à virgule, lorsque une séquence de chiffres  $a_{-1} \dots a_{-k}$  se répète à l'infini dans un nombre à virgule, on pourra le signifier par la notation  $\overline{a_{-1} \dots a_{-k}}$ . Par exemples :

$$0, \overline{3} = 0,333\dots = \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad 0,45\overline{123} = 0,45123123123\dots$$

Le but de cet exercice est de montrer que  $0, \overline{9} = 0,999\dots = 1$ .

1. Décomposer  $0, \overline{9}$  en base 10. Que remarquez-vous ?
2. Calculer  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{10^k}$ .
3. En déduire que  $0, \overline{9} = 1$ .

**Exercice 8.18.**  $[0, \overline{01}, ***]$  Un nombre s'écrit  $a_n \dots a_0, a_{-1} \dots a_{-m}$  en binaire s'il se décompose sous la forme :

$$a_n 2^n + \dots + a_0 2^0 + a_{-1} \frac{1}{2^1} + \dots + a_{-m} \frac{1}{2^m}.$$

1. Donner la décomposition en base 2 du nombre binaire  $0, \overline{01}$ .
2. Exprimer  $0, \overline{01}$  comme la limite d'une somme de termes d'une suite géométrique.
3. En déduire l'écriture de  $0, \overline{01}$  en base 10.

**Exercice 8.19.**  $[\text{Épidémie}, **]$  Lors de la phase exponentielle d'une épidémie, on estime que le nombre personnes atteintes de la maladie augmente de 10% chaque semaine. Toutefois, le système de santé peut soigner 2000 personnes par semaine. On note  $I_n$  le nombre de personnes infectés à la fin de la semaine  $n$ . On estime qu'il y a initialement 5000 personnes atteintes :  $I_0 = 5000$ .

1. Calculer le nombre d'infectés à la fin de des deux premières semaines.
2. Exprimer  $I_{n+1}$  en fonction de  $I_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
3. On pose  $u_n = I_n - 20000$ . Montrer que  $(u_n)$  est géométrique de raison 1,1.
4. Exprimer  $u_n$  puis  $I_n$  en fonction de  $n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
5. Montrer que  $I_n$  est décroissante.
6. (\*\*) Étudier les variations de  $I_n$  selon les trois cas suivants :

$$(a) I_0 < 20000; \quad (b) I_0 = 20000; \quad (c) I_0 > 20000.$$

7. Résoudre l'équation  $1,1x - 2000 = x$ . Que constatez-vous ? Comment nommeriez-vous la valeur  $x$  ?

**Exercice 8.20. [Tours de Hanoï,\*\*]** Les tours de Hanoï sont un jeu constitué de trois piquets de bois sur lesquels on empile des disques de bois de différentes tailles percés en leur centre, du plus large au plus petit. Le but du jeu est d'empiler les disques – toujours du plus large au plus petit – sur un des deux autres piquets. On a deux règles : on ne peut déplacer qu'un seul disque à la fois et on ne peut poser un disque que sur un autre disque plus grand ou un emplacement vide.

On appelle A, B et C les trois piquets et on note  $u_n$  le nombre minimal d'étapes nécessaires pour déplacer  $n$  disques.

1. Déterminer  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$ .
2. Soit  $n \geq 2$ . On suppose que l'on a réussi à déplacer les  $n - 1$  disques (en  $u_{n-1}$  étapes donc) les plus petits du piquet A au piquet B. On déplace alors le plus grand des disques du piquet A vers le C tant et si bien qu'il ne reste plus qu'à déplacer à nouveau les  $n - 1$  plus petits disques sur le C. En déduire une expression de  $u_n$  en fonction de  $u_{n-1}$ .
3. On définit pour tout  $n \in \mathbb{N}$  la suite  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  par  $v_n = u_n + 1$ .
  - (a) Montrer que  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est une suite géométrique de raison 2 et de premier terme à déterminer.
  - (b) En déduire pour tout  $n \in \mathbb{N}$  l'expression de  $v_n$  en fonction de  $n$  puis celle de  $u_n$ .
  - (c) En supposant qu'il faille cinq secondes pour déplacer un disque, combien de temps est nécessaire pour finir le jeu avec dix disques ?

### 8.4.3 Entraînement

**Exercice 8.21.** Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite arithmétique. Dans chaque cas, donner le terme général de  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  puis calculer  $u_0$ ,  $u_1$  et  $u_2$  et donner leurs variations.

1.  $u_0 = -2$  et  $u_3 = 8$ .
2.  $u_{14} = -6$  et  $u_{36} = -12$ .
3.  $u_{23} = 56$  et  $u_{27} = 42$ .

**Exercice 8.22.** Calculer la somme des 50 premiers termes des suites de l'exercice précédent.

**Exercice 8.23.** Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite géométrique. Dans chaque cas, donner le terme général de  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  puis calculer  $u_0$ ,  $u_1$  et  $u_2$  et donner leurs variations.

1.  $u_0 = -2$  et  $u_3 = 8$ .
2.  $u_{14} = -6$  et  $u_{36} = -12$ .
3.  $u_{23} = 56$  et  $u_{27} = 42$ .

**Exercice 8.24.** Calculer la somme des 50 premiers termes des suites de l'exercice précédent.

**Exercice 8.25.** Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_0 = 1$  et  $u_{n+1} = 3u_n - 1$ .

1. Calculer  $u_1$  et  $u_2$ .
2. On pose pour tout  $n \in \mathbb{N}$   $v_n = u_n - \frac{1}{2}$ .
  - (a) Montrer que  $(v_n)$  est géométrique de raison 3.
  - (b) En déduire l'expression de  $v_n$  puis de  $u_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
3. Montrer que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est croissante.

**Exercice 8.26.** Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_0 = 1$  et  $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 2$ .

1. Calculer  $u_1$  et  $u_2$ .
2. On pose pour tout  $n \in \mathbb{N}$   $v_n = u_n - 4$ .
  - (a) Montrer que  $(v_n)$  est géométrique de raison  $\frac{1}{2}$ .
  - (b) En déduire l'expression de  $v_n$  puis de  $u_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
3. Montrer que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est croissante.

## 8.5 Étude

On emprunte un capital 150 000€ afin de réaliser un achat immobilier. Un organisme de crédit nous l'accorde à un taux d'intérêts annuels fixe de 1,5%. L'emprunt sera remboursé en 20 ans avec des mensualités fixes  $m$ . À la fin de chaque année, les intérêts sont calculés sur le capital restant à rembourser et ajoutés à ce capital.

Afin de simplifier, on raisonnera d'abord avec des annuités (ce que l'on rembourse chaque année) fixes  $a = 12m$ . La première annuité intervient un an après la contraction du prêt. On note  $u_0$  le capital emprunté et  $u_n$  le capital restant dû après le versement de la  $n$ -ème annuité.

### 1. Modélisation

- (a) Expliquer pourquoi  $u_1 = u_0 \times 1,015 - a$ .
- (b) Expliquer pourquoi, pour tout entier naturel  $n < 19$ ,  $u_{n+1} = u_n \times 1,015 - a$ .
- (c) Expliquer pourquoi  $u_{20} = 0$ .

### 2. Étude de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$

- (a) On pose  $v_n = u_n - \frac{a}{0,015}$ . Montrer que  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est géométrique de raison 1,015 et exprimer  $v_n$  en fonction de  $n$ ,  $u_0$  et  $a$ .
- (b) Montrer que

$$u_n = 1,015^n u_0 + a \frac{1 - 1,015^n}{0,015}.$$

### 3. Calcul des mensualités

- (a) Montrer que

$$a = \frac{u_0 \times 1,015^{20} \times 0,015}{1,015^{20} - 1}.$$

- (b) En déduire le montant des annuités puis des mensualités.

4. **Cas général** Écrire un algorithme donnant le montant des mensualités pour un capital emprunté quelconque, un taux d'intérêt annuel quelconque et un nombre d'années de remboursement quelconque.